



## *Belette*

La **Belette** est le plus petit mustélide d'Europe. Son corps mince et allongé mesure environ 16 à 23 cm. Son pelage brun roux dessus et blanc dessous avec une queue courte de couleur uniforme est le même à toutes les saisons. Pouvant se faufiler dans de petits trous, elle est un prédateur spécialisé dans la capture des micromammifère (surtout de petits rongeurs).



## ***Campagnol amphibie***

Le **Campagnol amphibie** est un petit rongeur qui mesure entre 28 et 35 cm, il est actif toute l'année de jour comme de nuit. Il nage et plonge très bien. Il creuse son terrier dans la berge. Il consomme essentiellement des végétaux (joncs, graminées, quelques plantes aquatiques) mais aussi des insectes, des écrevisses, des alevins, des amphibiens....



## ***Chat domestique***

Passereaux, micromammifères, poissons, amphibiens, reptiles et invertébrés composent le régime alimentaire du **Chat domestique**.

Notre adorable prédateur est sûrement un prédateur du Desman.



## ***Hermine***

Petit mustélidé au corps allongé (20 à 30 cm), en hiver l'**Hermine** change de pelage et devient toute blanche sauf le pinceau final de la queue qui reste noir. Présente en zone de montagne de 1000 à 3000 mètres, à la recherche de micromammifère (campagnols, musaraignes, taupes...). Elle pourrait être prédatrice du Desman.





## *Loutre*

Mammifère semi-aquatique et principalement nocturne, son corps allongé de 60 à 80 cm se poursuit par une queue de 30 à 40 cm épaisse à la base. Quasi absente jusqu'au début 2000, elle recolonise progressivement les Pyrénées. La **Loutre** est une excellente nageuse qui peut demeurer sous l'eau pendant 2 minutes. C'est un prédateur essentiellement des poissons mais aussi des écrevisses, des batraciens. Des analyses d'épreintes dans le nord-ouest de l'Espagne montrent que la prédation sur le Desman est non négligeable.



### ***Musaraigne aquatique***

La **Musaraigne aquatique** cherche sa nourriture dans l'eau surtout la nuit, (crustacés, gastéropodes, insectes...). Elle capture aussi des proies plus grandes, comme des grenouilles ou des petits poissons. Les cils natatoires rigides sur les pattes arrières et la queue en font une excellente nageuse. Sa taille est de l'ordre de 6 à 12 cm. Avec son museau allongé, elle est parfois confondue avec le Desman.



## ***Putois***

La tête du **Putois** présente un masque blanc et noir caractéristique. Sa taille est de l'ordre de 35 à 45 cm. Il est actif de jour comme de nuit, silencieux, furtif, et assez discret. Il grimpe rarement mais plonge et nage très bien. Il se nourrit notamment de rongeurs comme les rats musqués, les surmulots, les lapins de garenne mais aussi de batraciens, de poissons, de reptiles. Ses effectifs sont en chute.



## ***Ragondin***

Le **Ragondin** est originaire d'Amérique du Sud. Elevé pour sa fourrure, les animaux échappés ont colonisé les milieux aquatiques. 80 à 100 cm de long, c'est un animal plutôt nocturne. Ses 4 incisives sont bien visibles et de couleur orange. Les pattes arrière sont palmées et il a une queue cylindrique. Il dégrade les berges en creusant des terriers peu profonds. Il se nourrit essentiellement de végétaux.





## ***Rat musqué***

Le **Rat musqué** est originaire d'Amérique du Nord, élevé pour sa fourrure, les animaux échappés ont ainsi colonisé les milieux aquatiques. De 50 à 60 cm de long, ce rongeur amphibie est essentiellement nocturne. Sa queue écailleuse est aplatie verticalement. Il dégrade les berges en y creusant de nombreuses galeries et peut déchausser des saules. Cet omnivore se nourrit principalement de végétaux, mais aussi de petits animaux.



## ***Taupe***

La **Taupe** fait partie de la même famille que le Desman mais elle vit surtout dans les prairies jusqu'à 2000 m d'altitude. Elle évolue dans un réseau de galeries d'une longueur de 100 à 200 m, situées entre 15 cm et 50 cm de profondeur. Une ouïe, un sens tactile et un odorat très développés pallient une vue déficiente et lui permettent la détection de ses proies jusqu'à une distance d'environ 10 cm. Elle se nourrit de vers de terre et d'insectes.



## *Vison d'Amérique*

Le **Vison d'Amérique** est originaire d'Amérique du Nord. Elevé pour sa fourrure, certains individus se sont échappés et acclimatés au milieu naturel. Morphologiquement proche du Vison d'Europe, avec lequel il est en compétition, il est légèrement plus gros que ce dernier et la tache blanche au menton se limite à la lèvre inférieure. Il est présent dans tous les milieux aquatiques d'eau douce. Il se nourrit d'oiseaux, de poissons et de micromammifère. Des cas de prédation sur le Desman sont connus en Espagne.



## ***Vison d'Europe***

Le **Vison d'Europe** a le triste privilège d'être classé comme l'un des mammifères d'Europe les plus menacés. Dans les Pyrénées, il n'est présent que dans les Pyrénées-Atlantiques.


Semi aquatique, il est plutôt nocturne. Opportuniste, il consomme toutes les proies les plus abondants et accessibles (oiseaux, campagnols amphibies, amphibiens et petits poissons). La mortalité routière est la principale cause de mortalité pour les individus retrouvés morts.





## ***Bergeronnette des ruisseaux***

La **Bergeronnette des ruisseaux** arbore un beau poitrail jaune vif et une bavette noire qui disparaît après la période de reproduction. Dépendante de l'eau courante, elle niche le long des torrents et des rivières de montagne en milieu ouvert ou boisé. Dès les premiers froids hivernaux, elle migre en redescendant à des altitudes plus clémentes. Toujours en mouvement, elle recherche sur les petits rochers ou les rives les insectes aquatiques.



## ***Cingle plongeur***

Le **Cingle plongeur** est un oiseau bien particulier car il peut marcher sous l'eau pour aller chercher certaines de ses proies. Il est insectivore et va capturer les mêmes proies que le Desman mais bien d'autres aussi, comme des insectes aquatiques adultes, des crustacés, des mollusques, des vers et des sangsues.



## ***Grand cormoran***

Le **Grand cormoran** vit à proximité des points d'eau plutôt en plaine. Il a un comportement grégaire, en particulier lorsqu'il pêche. L'augmentation de ses effectifs a des conséquences sur les populations de poissons et il peut être à l'origine de dégâts, notamment sur les piscicultures. C'est pourquoi, cette espèce protégée peut faire l'objet de mesures de régulation.



## ***Héron cendré***

Grand échassier de plus d'1,80 m d'envergure, le **Héron cendré** vit dans les eaux peu profondes. Il peut rester immobile longtemps en attendant le passage d'une proie (poissons, amphibiens, crustacés, mollusques, invertébrés aquatiques, serpents, rongeurs et petits oiseaux...). Nicheur plutôt en plaine, il s'observe de plus en plus en montagne. Il pourrait être prédateur du Desman.





## ***Martin pêcheur***

Facilement reconnaissable à sa robe bleu turquoise, le **Martin pêcheur** se rencontre au bord des eaux calmes et peu profondes. Il capture ses proies composées de petits poissons depuis des perchoirs (branches d'arbres, poteaux émergeant de la surface de l'eau...) ou en utilisant la technique du vol stationnaire au dessus de l'eau. Il niche dans un terrier creusé dans la berge d'un cours d'eau.